




واحد آموزش سلامت

- این آزمون در حدود ۶۰-۴۰ دقیقه طول می کشد. قبل از آزمون از شما خواسته می شود که لباسان را خارج کنید و به جای آن، گان (لباس مخصوص بیمار) را بپوشید.

چه کسی این آزمون را انجام می دهد؟

رادیولوژیست (پزشک رادیولوژی) و تکنسین رادیولوژی در اتاق با شما همراه خواهند بود. آنها قبل از شروع به شما نحوه انجام آزمون را توضیح خواهند داد، در این مورد نیز تردید به خود راه ندهید و اگر چیزی را متوجه نشدید از آنها سوال کنید.

Barium enema



آمادگی:

- پیش از انجام باریوم انما، طبق دستور پزشک باید کولون خود را کاملاً تخلیه کرده و آمادگی کامل داشته باشید. هر ماده ای که در کولون شما باقی بماند می تواند تصاویر اشعه ایکس را مبهم کرده و پزشک را در تشخیص دچار مشکل کند.

جهت تخلیه روده:

روز قبل از انجام تست، رژیم غذایی مخصوص داشته باشید. به این صورت که: غذا نخورید و فقط مایعات شفاف بنوشید، مانند آب، چای، قهوه بدون شیر، آب گوشت و ... شب قبل از انجام تست، ناشتا بوده و یک شیشه روغن کرچک بخورد. چنانچه تمایلی به خوردن روغن کرچک ندارد می تواند ۳ عدد قرص بیزاکودیل به فاصله های نیم ساعت میل نماید.

توجه:

۱- حداقل یک هفته قبل از انجام تست، با پزشکتان در مورد داروهایی که به طور مرتب از آنها استفاده می کنید، مشورت کنید. شاید از شما خواسته شود مصرف آنها را چند ساعت یا چند روز قبل از انجام تست قطع کنید.

۲- هر گونه جراحی قبلی شکمی یا روده ای را که باعث تاثیر در نوع آمادگی برای این آزمون می شود را به رادیولوژی اطلاع دهید. از جمله این جراحی ها (کولوستومی)

۳- بیماران خانم لطفاً قبل از انجام تست، حاملگی و یا احتمال آنرا به رادیولوژی اطلاع دهند.

فردای آن روز، ناشتا ۳ بسته سولفات باریوم و ۲ عدد ملحفه بزرگ و تمیز و یک دست لباس راحتی با خود بیاورد.

باریم انما نوعی تصویر برداری با اشعه ایکس است که می تواند تغییرات یا ناهنجاری ها را در روده بزرگ (کولون) تشخیص دهد.

انما تزریق ماده ای به درون رکتوم (انتهای روده بزرگ) از راه یک لوله کوچک است. که در باریوم انما، این ماده، **باریم** می باشد.

باریوم چیست ؟



باریوم یک ماده گچ مانند است که در آب محلول (معلق) و با اشعه ایکس قابل رویت می باشد.

مابع حاوی باریوم مانند پوششی روی دیواره داخلی کولون را می پوشاند. در حالت طبیعی تصاویری که اشعه ایکس از بافت نرم می گیرد، کیفیت پائینی دارد، اما پوشش باریوم باعث می شود تصاویر سیاه و سفید نسبتاً شفافتری از کولون به دست آید. این ماده بی خطر بوده و باید آگاه بود که مصرف آن ممکن است باعث یبوست ملایم شود. نوشیدن آب و داشتن رژیم فیبر به مدت چند روز این عوارض (یبوست) را برطرف می کند.

در چه مواردی پزشک برای شما درخواست باریوم انما میدهد؟

درد شکمی
خونریزی از مقعد
تغییر در عادات روده ای
کاهش وزن غیر قابل توجیه
اسهال مزمن



بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)

راهنمای بیمار

باریم انما



تهیه و تنظیم :

واحد آموزش سلامت

بازنگری بهار ۱۴۰۴

کد پمفلت: Pa.P-E.12.AH.۱

سایت مرکز:

www.amiralmomeninhospital.com

بعد از انجام آزمون :

رادیولوژیست تصاویر به دست آمده را مرور کرده و یک گزارش نوشته شده ای را به پزشک ارجاع دهنده (پزشک بالینی) شما می فرستد. سی دی و یا فیلم های مربوطه بعد از آزمون به شما داده شده و یا فرستاده می شود.



منبع:

پدیدآورنده: ف. ترکی (تکنسین رادیولوژی)

پزشک مشاور: دکتر علیرضا مومنی (رادیولوژیست)

طراحی و تنظیم: مسئول آموزش سلامت

نحوه انجام روش :

چون روده ساختار بافت نرم را دارد بنابراین در رادیوگرافی ساده دیده نمی شود. با استفاده از باریوم لایه داخلی آنها پوشش داده می شود و رادیولوژیست می تواند به وضوح تصویر روده را روی صفحه مخصوص ببیند و آناتومی آن را مطالعه کند.

لوله کوچک آغشته به ژل توسط پزشک و یا تکنسین به داخل مقعد شما جاگذاری می شود. این کار معمولاً کمی ناراحتی به دنبال دارد و اگر این کار باعث ناراحتی و یا اذیت بیشتر شما شد، به پزشک اطلاع دهید.

* رادیولوژیست به آهستگی باریوم را در لوله به جریان درمی آورد و به تدریج باریوم وارد روده بزرگ میشود. میزان کمی از هوا نیز وارد می شود، باریوم لایه داخلی روده را تحت پوشش قرار می دهد و این باعث بهتر دیده شدن لوپ (پیچ های روده) می شود. رادیولوژیست سپس یک سری تصویر از روده هایی که با باریوم پوشانده شده اند، تهیه می کند. رادیولوژیست در طول تصویر برداری برای هر عکس از شما می خواهد که نفستان را نگه دارید و از شما تقاضا می کند که به منظور بهتر دیده شدن روده دور خود بچرخید.

* بعد از رویت تصاویر توسط رادیولوژیست و کامل شدن آزمون، شما می توانید جهت تخلیه باریوم و هوای تجویز شده به دستشویی بروید. برخی اوقات تزریق (انمای) باریوم باعث ناراحتی جزئی و یا کرامپ (انقباض عضلانی) می شود. اگر احساس ناراحتی دوباره به شما دست داد می توانید به توالت برگشته و یا با کمک همراه به پیاده روی بپردازید.

* توجه فرمایید که باریوم به مدت چند روز در روده شما باقی خواهدماند و ممکن است تا چند روز مدفوع سفید رنگ داشته باشید که آنهم به دلیل خروج باریوم است ، این ماده بی خطر است فقط احتمال یبوست مطرح می باشد که با مصرف مایعات و رژیم پر فیبر میتوانید عارضه یبوست را بر طرف کنید.